TRATTAMENTI CONTRO LE ZANZARE
RACCOMANDAZIONI

COMUNE DI SCANDIANO

Delibera Giunta Regionale n. 442 del 27/03/2023

I trattamenti contro le zanzare possono essere diretti contro le larve (**trattamenti larvicidi**), contro le zanzare adulte per sopprimerle (**trattamenti adulticidi**) o per allontanarle (**repellenti**).

I trattamenti adulticidi con prodotti insetticidi nelle aree cortilive o nei giardini delle scuole **sono altamente sconsigliati** in quanto:

1.

i bambini sono soggetti particolarmente sensibili agli effetti tossicologici dei prodotti biocidi adulticidi e, di conseguenza, maggiore è il rischio di manifestazioni allergiche e/o asmatiche e l'insorgenza di possibili effetti neurotossici e sul sistema endocrino

2.


l'indicazione di non effettuare trattamenti con adulticidi si giustifica con il fatto che le zanzare difficilmente costituiscono un rischio sanitario per i bambini

3.

per quanto riguarda la possibilità di contrarre una malattia trasmessa dalle zanzare, si precisa che:

- i virus veicolati da zanzara tigre sono presenti solo occasionalmente nel territorio dell'Emilia Romagna e il Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi prevede interventi ad hoc per contrastare lo sviluppo di epidemie

- relativamente al virus West Nile, stabilmente presente in Regione, le zanzare Culex spp., vettrici di questo virus, si attivano in cerca del pasto di sangue prevalentemente in orari serali notturni, quando le scuole sono deserte





SCANDIANO SOSTENIBILE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Nel caso di elevata infestazione che determina un eccessivo fastidio alla popolazione infantile, si può, **in via eccezionale**, procedere all'esecuzione di **trattamenti adulticidi straordinari**, ma è obbligatorio:

- richiedere il **parere al Dipartimento di Sanità Pubblica** che li potrà autorizzare solo a seguito di un'attenta valutazione del rischio per la popolazione infantile, effettuata da personale competente e dopo aver accertato l'adozione di tutte le altre misure di lotta integrata
- prima dell'intervento fornire a genitori, personale scolastico e residenti intorno alla scuola un'**informazione preventiva** sull'esecuzione dei trattamenti adulticidi e sul rischio ad essi associato; dovrà anche essere ricordato che gli interventi adulticidi hanno un effetto immediato nel breve periodo sul controllo delle popolazioni di zanzara presenti in un determinato ambiente ma, indipendentemente dalla molecola chimica, non prevengono la proliferazione delle zanzare, hanno scarsa efficacia e breve durata
- eseguire l'intervento adulticida **durante la chiusura delle scuole** da parte di personale qualificato seguendo scrupolosamente le indicazioni indicate nel parere preventivo del Servizio Igiene e Sanità Pubblica
- attendere almeno 48 ore dopo l'intervento prima di riutilizzare l'area trattata

Protezione diretta del bambino:

- indossare maglie a maniche lunghe, pantaloncini lunghi, di colore preferibilmente chiaro

- non utilizzare repellenti nei bambini al di sotto di tre mesi di vita; dai 3 mesi fino a 3 anni di età, applicare eventualmente repellenti solo sulla parte esterna dei capi di abbigliamento nelle parti che non possano essere succhiate; dai 3 ai 12 anni, non applicare su mucose (labbra, bocca), occhi, cute irritata o ferita

- in ogni caso la scelta del repellente deve essere fatta in base alla concentrazione di principio attivo: è consigliabile usare esclusivamente prodotti con concentrazione minore o uguale al 10% e non superare le due applicazioni